

" Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries plutôt que sa connerie sur des choses intelligentes "

Teddy et Adrien

Notations.

- On note $[x]$ la partie entière du réel x .
- On se place dans le plan euclidien \mathbb{R}^2 muni de son repère orthonormé canonique \mathcal{R} , d'origine O .

Les trois parties sont dans une large mesure indépendantes ; les parties II et III utilisent les notations $R(z)$ et $V_n(z)$ introduites dans la première partie.

I. Première partie.

- I.A.** Soit z un nombre complexe, de partie réelle x et de partie imaginaire y , tels que $(x, y) \notin \mathbb{R}^- \times \{0\}$. On note

$$\theta(z) = 2 \arctan \left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right) \quad \text{et} \quad R(z) = \frac{z + |z|}{\sqrt{2(Re(z) + |z|)}}$$

I.A.1 Justifier que θ et R sont bien définis.

I.A.2 Lorsque z vaut successivement $z_1 = 4$, $z_2 = 2i$, $z_3 = 1 - i\sqrt{3}$, calculer $R(z)$, $\theta(z)$ et $(R(z))^2$.

I.A.3 Vérifier que $\theta(z) \in [-\pi, \pi[$ et que $R(z) \in \mathcal{P} = \{Z \in \mathbb{C} / Re(Z) > 0\}$.

I.A.4 Représenter sur une figure le cercle \mathcal{C} de centre O de rayon $|z|$ et les points M d'affixe z et B d'affixe $-|z|$.

En considérant des angles bien choisis, montrer que

$$\theta(z) = \text{Arg}(z) = 2\text{Arg}(z + |z|)$$

où $\text{Arg}(z)$ désigne la détermination principale de l'argument du nombre complexe z .

I.A.5 Déterminer $(R(z))^2$, $\theta \circ R(z)$ et $|z|^{1/2}e^{i\theta(z)/2}$ en fonction de z , $R(z)$ et $\theta(z)$.

I.A.6 Résoudre à l'aide de E l'équation $Z^2 = z$, d'inconnue $Z \in \mathbb{C}$.

I.A.7 En déduire que R est une bijection de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ dans \mathcal{P} . Préciser sa bijection réciproque.

Dans la suite du problème, on prolonge R à \mathbb{C} en posant $R(x) = i\sqrt{|x|}$ si $x \in \mathbb{R}^-$.

I.B. Soient a, b deux nombres complexes tels que $(a, b) \neq (0, 0)$.

On dit qu'une suite complexe $U = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence $(E_{a,b})$ si l'on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2au_{n+1} + bu_n$$

I.B.1 On suppose que $a^2 + b \neq 0$. On note $d = R(a^2 + b)$. On appelle W la suite $W = ((a + d)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et W' la suite $W' = ((a - d)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Montrer que U vérifie $E_{a,b}$ si et seulement si $U \in \text{Vect}(W, W')$.

Déterminer U vérifiant $E_{a,b}$ et les conditions initiales $u_0 = 0$ et $u_1 = 1$ en fonction de d , W et W' .

I.B.2 On suppose que $a^2 + b = 0$ et $a \neq 0$. On note W et W' les suites $W = (a^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $W' = (na^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que U vérifie $E_{a,b}$ si et seulement si $U \in \text{Vect}(W, W')$.

Déterminer U vérifiant $E_{a,b}$ et les conditions initiales $u_0 = 0$ et $u_1 = 1$ en fonction de a , W et W' .

Dans la suite du problème, on note :

- $U(a, b) = (U_n(a, b))_{n \in \mathbb{N}}$ l'unique suite vérifiant $E_{a,b}$ et les conditions initiales $U_0(a, b) = 0$ et $U_1(a, b) = 1$;
- $V_n(z) = U_{n+1}(z, -1)$ pour tous $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$.

I.B.3 Expliciter $V_1(z)$, $V_2(z)$ et $V_3(z)$ et déterminer leurs racines dans \mathbb{C} .

I.B.4 Montrer que, pour tous $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$V_n(z) = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-j}{j} (2z)^{n-2j} (-1)^j \quad (I.1)$$

II. Deuxième partie.

Soit $z \in \mathbb{C}$. On note C_z (respectivement Ω_z) l'ensemble des points du plan d'affixe complexe Z tels que $|Z(Z - 2z)| = 1$ (respectivement $|Z(Z - 2z)| < 1$).

II.A. Dans cette question, on suppose que z est un réel noté a .

On se place dans le repère orthonormé \mathcal{R}' de centre O' d'affixe a , déduit de \mathcal{R} par translation.

II.A.1 Montrer qu'une équation de la courbe C_a en " coordonnées polaires (ρ, θ) " dans le repère \mathcal{R}' est

$$(\rho^2 + a^2)^2 - 4a^2\rho^2 \cos^2(\theta) = 1$$

II.A.2 Simplifier cette équation lorsque $a = 1$. Etudier et tracer l'allure de la courbe C_1 .

II.B. On suppose à nouveau z complexe quelconque.

II.B.1 Justifier que Ω_z est une partie bornée du plan. Est-elle ouverte ? Fermée ? Compacte ?

II.B.2 Justifier que l'origine O est un point intérieur à Ω_z .

II.C. On reprend dans cette question la notation R introduite dans la première partie à la question

I.A.

II.C.1 Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^2 \neq 1$. On note

$$r = |R(z^2 - 1)|, \quad s = |z + R(z^2 - 1)|, \quad t = |z - R(z^2 - 1)|, \quad h = \max(s, t)$$

Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|V_n(z)| \leq \frac{h^{n+1}}{r}$.

II.C.2 Que dire du rayon de convergence de la série entière $Z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} V_n(Z)Z^n$?

On note g_z sa somme.

II.C.3 Lorsque cela a un sens, calculer $(1 - 2zZ + Z^2)g_z(Z)$.

II.C.4 Déterminer l'ensemble de définition D_z de la fonction $Z \mapsto \frac{1}{1-2zZ+Z^2}$.

II.C.5 Montrer qu'il existe un disque ouvert non vide Δ de centre O inclus dans Ω_z tel que

$$\forall Z \in \Delta, \quad \frac{1}{1-2zZ+Z^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} V_n(z)Z^n = \sum_{p=0}^{+\infty} (Z^p(2z - Z)^p)$$

II.C.6 En déduire que la fonction de la variable réelle x

$$G_z : x \mapsto \sum_{p=0}^{+\infty} (x^p(2z - x)^p)$$

admet un développement limité à tout ordre en 0. On le note

$$G_z(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n) \quad x \rightarrow 0$$

Déterminer les coefficients a_k pour $k \in \mathbb{N}$.

II.C.7 Retrouver alors la relation (I.1).

III. Troisième partie.

On note :

- α un réel tel que $\alpha > -1/2$;
- E le \mathbb{R} -espace vectoriel des fonctions de classe C^∞ sur $[-1, 1]$ à valeurs réelles ;
- F_n le sous-espace de E des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à $n \in \mathbb{N}$;
- φ_α l'application qui à toute fonction y de E associe la fonction

$$\varphi_\alpha(y) : t \mapsto (1 - t^2)y''(t) - (2\alpha + 1)ty'(t)$$

- S_α l'application de $E \times E$ dans \mathbb{R} définie par

$$S_\alpha(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)(1 - t^2)^{\alpha - \frac{1}{2}} dt$$

III.A.

III.A.1 Vérifier que S_α est un produit scalaire sur E .

III.A.2 Justifier que φ_α est un endomorphisme de E . Est-il injectif ?

III.A.3 Montrer que

$$\forall (f, g) \in E^2, S_\alpha(\varphi_\alpha(f), g) = S_\alpha(f, \varphi_\alpha(g))$$

On pourra calculer la dérivée de $t \mapsto (1 - t^2)^{\alpha + \frac{1}{2}} f'(t)$.

III.B. Soit $n \in \mathbb{N}$.

III.B.1 Justifier que φ_α induit sur F_n un endomorphisme et que cet endomorphisme induit (encore noté φ_α) est diagonalisable.

III.B.2 Montrer qu'il existe une base de F_n constituée de vecteurs propres de φ_α de degrés deux à deux distincts.

III.B.3 Vérifier que deux vecteurs propres de φ_α de degrés distincts sont associés à deux valeurs propres distinctes. *On pourra s'intéresser au coefficient dominant d'un polynôme judicieux.*

III.B.4 Justifier que deux vecteurs propres de φ_α de degrés distincts sont orthogonaux.

III.B.5 Montrer que tout vecteur propre de φ_α de degré supérieur ou égal à 1 s'annule au moins une fois dans l'intervalle $]-1, 1[$.

III.C. Dans cette partie, on suppose $\alpha = 1$. On note $\|\cdot\|$ la norme associée à S_1 .

III.C.1 Justifier que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme vecteur propre de φ_1 de degré k , de norme 1 et de coefficient dominant positif. On le note T_k .

III.C.2 Soit $t \in]0, \pi[$. Montrer que la fonction

$$H_t : x \mapsto \frac{1}{1 - 2x \cos(t) + x^2}$$

est développable en série entière sur $]-1, 1[$.

III.C.3 En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in]0, \pi[, V_n(\cos(t)) = \frac{\sin((n+1)t)}{\sin(t)}$$

III.C.4 En dérivant deux fois la fonction $t \mapsto \sin(t)V_n(\cos(t)) - \sin((n+1)t)$, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, V_n est vecteur propre de φ_1 .

III.C.5 En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, V_n et T_n sont proportionnels. Expliciter le coefficient de proportionnalité.

III.C.6 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer les racines de T_n .